Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS

Office fédéral de la protection de la population OFPP
Laboratoire Spiez

PRESTATIONS DU GROUPE BACTÉRIOLOGIE

ÉCHANTILLONS CLINIQUES

Agent	*Analyse*	*Méthode de mesure*	*Matériel de prélèvement*[2]	*Fréquence*	*Durée*	*Méth. accr.*[1]
Bacillus anthracis	Culture	Culture	Prélèvements (vésicule, escarre, nez, gorge), culture sanguine, biopsie cutanée, LCR, plèvre, échantillon respiratoire, sécrétion (hémorragique)	lu-ve	env. 3 jours[2]	non
***Brucella* spp.**	Amplification génique	Real-time PCR	Prélèvements (vésicule, escarre, nez, gorge), sang, biopsie cutanée, LCR, plèvre, échantillon respiratoire, sécrétion (hémorragique)	lu-ve	≤2 jours	oui
	Culture	Culture	Matériel provenant d'un abcès, culture sanguine, ponction articulaire, moelle osseuse, biopsie hépatique, LCR, ganglions lymphatiques, biopsie de la rate	lu-ve	env.14 jours[2]	non
Burkholderia mallei	Amplification génique	Real-time PCR	Matériel provenant d'un abcès, sang, ponction articulaire, moelle osseuse, biopsie hépatique, LCR, ganglions lymphatiques, biopsie de la rate	lu-ve	≤2 jours	oui
	Culture	Culture	Prélèvement (plaie), matériel provenant d'un abcès, culture sanguine, moelle osseuse, échantillon respiratoire, urine	lu-ve	env.10 jours[2]	non
Burkholderia pseudomallei	Culture	Culture	Prélèvement (plaie), matériel provenant d'un abcès, culture sanguine, moelle osseuse, échantillon respiratoire, urine	lu-ve	env. 3 jours[2]	non
	Amplification génique	Real-time PCR	Prélèvement (plaie), matériel provenant d'un abcès, sang, moelle osseuse, échantillon respiratoire, urine	lu-ve	≤2 jours	oui

[1] accrédité (STS 0054);
[2] dépendant de la vitesse de multiplication de l'agent pathogène

Agent	*Analyse*	*Méthode de mesure*	*Matériel de prélèvement*[2]	*Fréquence*	*Durée*	*Méth. accr.*[1]
Coxiella burnetii	Amplification génique	Real-time PCR	Sang, biopsie endocardique, moelle osseuse, biopsie hépatique, liquide céphalo-rachidien	lu-ve	≤2 jours	oui
Francisella tularensis	Culture	Culture	Prélèvement (conjonctive, gorge), culture sanguine, liquide céphalo-rachidien, ganglions lymphatiques, échantillon respiratoire, matériel provenant d'un ulcère, urine	lu-ve	env.14 jours[2]	non
	Amplification génique	Real-time PCR	Prélèvement (conjonctive, gorge), sang, liquide céphalo-rachidien, ganglions lymphatiques, échantillon respiratoire, matériel provenant d'un ulcère, urine	lu-ve	≤2 jours	oui
Yersinia pestis	Culture	Culture	Aspirat de bubon, culture sanguine, liquide céphalo-rachidien, biopsie pulmonaire, ganglions lymphatiques, échantillon respiratoire	lu-ve		non
	Amplification génique	Real-time PCR	Aspirat de bubon, sang, liquide céphalo-rachidien, biopsie pulmonaire, ganglions lymphatiques, échantillon respiratoire	lu-ve	≤2 jours	oui

Juillet 2026

[1] accrédité (STS 0054);
[2] dépendant de la vitesse de multiplication de l'agent pathogène